

Μεταφορά Μόσχων

Μεταφορά νεαρών μόσχων

Οι μόσχοι – ιδιαίτερα κατά τον απογαλακτισμό - είναι **πολύ επιρρεπείς** σε ασθένειες (π.χ. του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος). Η μεταφορά μπορεί εύκολα να στρεσάρει αυτά. Επιπλέον, οι νεαροί μόσχοι είναι δύσκολοι διαχειρίσιμοι σε ομάδες, γιατί το ένστικτο της αγέλης δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί. **Ορθές πρακτικές διαχείρισης** αποτρέπουν ανεπιθύμητες συνέπειες και θα είναι επωφελείς για άλλους ζωοτεχνικούς δείκτες (καλύτερη πρόσληψη βάρους ή λιγότερες ασθένειες)



©Henk van Dommelen



- Μοσχάρια με **μη επουλωμένους ομφαλούς**: Απαγορεύεται κάθε μεταφορά
- **Μοσχάρια κάτω των 10 ημερών**: επιτρέπονται μεταφορές έως μέγιστο 100 χιλιομέτρων, κάτω από ειδικές συνθήκες
- **Μοσχάρια κάτω των 14 ημερών**: απαγορεύονται μακρινά ταξίδια
- **Ακόμα καλύτερα! Μεταφέρετε** απογαλακτισμένους μόσχους μετά από 8 εβδομάδες
- Εάν κατά τη στάση κάποιο ζώο παραμένει ξαπλωμένο, **καλέστε έναν κτηνίατρο**

Προετοιμασία μόσχων

- Παρέχετε **κατάλληλη στρωμνή** (π.χ. άχυρο) που εξασφαλίζει άνεση ανάλογα με τον αριθμό των ζώων, τον χρόνο ταξιδιού, τις καιρικές συνθήκες, και την δυνατότητα απορρόφησης ούρων και κοπράνων
- Χρησιμοποιείτε **πλαϊνά προστατευτικά** στο κατάστρωμα, ώστε να αποφύγετε την παγίδευση των ποδιών ανάμεσα στο κατάστρωμα και στα πλαϊνά τοιχώματα
- Όταν οι μόσχοι μεταφέρονται σε **ομάδες**, περιορίστε το μέγεθος των ομάδων στα **10 - 15 ζώα**
- Εάν χρησιμοποιείται ράμπα, η κλίση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη (μεγ. 20°, 36%)
- Φορτώστε τους **μόσχους με καθοδήγηση του καθενός ζώου ατομικά** πάνω στη ράμπα
- Σε περίπτωση **ταξιδιών μακράς διάρκειας**. Καλέστε την εκτροφή ή τα σημεία ελέγχου για να εξασφαλίσετε άμεσα την παροχή νερού και τροφής κατά την άφιξη, και κατάλληλες κλιματικές συνθήκες για τους μόσχους (π.χ. προ-θέρμανση του κτιρίου)
- **Απαγορεύεται η φίμωση** των μόσχων



©Henk van Dommelen




© IDELE



Μεταφορά μόσχων

Παροχή τροφής και νερού



©Dr. Rabitsch

Μη απογαλακτισμένοι μόσχοι

Η παροχή υγρής τροφής σε μοσχάρια κατά τη μεταφορά, θεωρείται η πρακτική που πρέπει να εφαρμόζεται για τα περισσότερα οχήματα μεταφοράς. Επομένως, **οι μόσχοι ίσως πρέπει να εκφορτώνονται** και να τους παρέχετε υγρή τροφή ανάμεσα από τις στάσεις.



Απογαλακτισμένοι μόσχοι

Παρέχετε στις ταΐστρες συμπυκνωμένη τροφή με βάση δημητριακά στις στάσεις. Όμως, επιβεβαιώστε **ότι οι μόσχοι έχουν εξοικειωθεί με το συγκεκριμένο είδος σιτηρεσίου**. Ξαφνικές αλλαγές μπορεί να προκαλέσουν αδιαθεσία.

Ορθή ποσότητα υγρής τροφής: 2 λίτρα / 12 ώρες

- **Ταΐστε τους μόσχους ατομικά** και παρέχετε **ανάπαυση για τουλάχιστον 1 ώρα**, πριν ξαναξεκινήσει το ταξίδι
- Βεβαιωθείτε ότι **το σύστημα ποτίσματος** είναι καθαρό, συντηρημένο καλά και λειτουργικό
- Βεβαιωθείτε ότι οι μόσχοι **είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα ποτίσματος** για την παροχή γάλακτος, υποκατάστατου γάλακτος και διαλύματα ηλεκτρολυτών στη σωστή θερμοκρασία (π.χ. χρησιμοποιείτε λαστιχένιες θηλές)
- Εάν οι μόσχοι δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν την ποτίστρα, εξασφαλίστε μια μικρή στάγδην παροχή για να **ξεκινήσουν να πίνουν** ή χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για τους καθοδηγήστε.
- **Ελέγχετε προσεκτικά τους μόσχους** για να εξασφαλίστε ότι λαμβάνουν αρκετή τροφή/νερό. Εάν δεν μπορούν να πιούν από το σύστημα ποτίσματος, παρέχετε νερό ή γάλα χειρωνακτικά

Θερμοκρασία

Βέλτιστη θερμοκρασία: 5°C έως 25°C. Διατηρείτε σταθερή θερμοκρασία, οι μόσχοι είναι ευαίσθητοι στις αλλαγές της θερμοκρασίας



- Παρέχετε **περισσότερο χώρο**
- Επιπλέον **ανεμιστήρες** για εξαερισμό
- Εάν χρειάζεται, **ψεκάστε νερό**
- Σε καθυστερήσεις, **ποτίστε χειρωνακτικά** τους μόσχους
- Μην μεταφέρετε σε **θερμοκρασίες πάνω από 30 °C**



- **Προ-θερμάνετε το όχημα** πριν τη φόρτωση
- Παρέχετε **επιπλέον στρωμνή**
- Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε **επιπλέον θέρμανση**

PDF

ISBN :978-92-79-81099-2

doi: 10.2875/381597

EW-BK-18-003-EL-N

