

Ταξίδια μακράς διάρκειας βοοειδών

Ταξίδια μακράς διάρκειας=
Άνω των 8 ωρών, συμπεριλαμβανομένων στάσεων και (εκ)φόρτωσης

Είδος	Διάρκεια ταξιδιού		
Βοοειδή	Μεγ. 14 ώρες μεταφορά	Ελαχ. 1 ώρα στάση (παροχή νερού και τροφής)	Μεγ. 14 ώρες μεταφορά
Μη απογαλακτισμένοι μύσοχοι	Μεγ. 9 ώρες μεταφορά	Ελαχ. 1 ώρα στάση (παροχή νερού και τροφής)	Μεγ. 9 ώρες μεταφορά

Έπειτα από τα ανωτέρω μέγιστα επιτρεπόμενα ταξίδια, τα ζώα πρέπει να εκφορτωθούν, να τραφούν και να ποτιστούν, και να αναπαυθούν για τουλάχιστον 24 ώρες



Προετοιμασία: συγκεκριμένη οργάνωση και προβλέψεις

- Ελέγξτε το **μετεωρολογικό δελτίο** για να αποφύγετε ακραία καιρικά φαινόμενα
- Σχεδιάστε** την πορεία του ταξιδιού και ελέγξτε τη διάρκειά του
- Ελέγξτε τα σημεία στάσεων και/ή τα σημεία ελέγχου** για την ποιότητα της τροφής, τον εξοπλισμό παροχής νερού και τροφής, εξοπλισμό αμελκτηρίου (για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής). Κάντε κράτηση εάν όλα είναι ΕΝΤΑΞΕΙ!
- Ελέγξτε εάν το όχημα έχει **σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας** σε λειτουργία και καθαρές **ποτιστρες**
- Ελέγξτε ότι έχετε όλα τα **απαραίτητα έγγραφα** (σχέδια έκτακτης ανάγκης, σχέδια ταξιδιού, πιστοποιητικά υγείας)
- Οργανώστε** την φόρτωση
- Ζητείστε **όλα τα βοοειδή να είναι ξεκούραστα, ποτισμένα και ταϊσμένα** με καλής ποιότητας ζωοτροφή



©Eyes on Animals



©Henk van Dommelen

Ημέρα Φόρτωσης!

- Προετοιμάστε** το όχημα
 - Παρέχετε καθαρή και φρέσκια στρωμένη (**άχυρο**) (10kg άχυρο/m², να καλύπτει όλη την επιφάνεια του δαπέδου)
 - Ετοιμάστε **νερό και τροφή** ανάλογα με το είδος και αριθμό των ζώων
- Φορτώστε όλα τα βοοειδή **ήρεμα**
- Ξεκινήστε** το ταξίδι αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η φόρτωση

Ενήλικα βοοειδή	
Τροφή	Νερό
2 kg / 100 kg βάρους ζώου, άχυρο καλής ποιότητας	10 – 50 L/ημέρα/ζώο, ανάλογα με την ηλικία και τις κλιματικές συνθήκες





Ένα ταξίδι με την ελάχιστη καταπόνηση για τα ζώα

- Οδηγείτε **ομαλά** και να προτιμάτε **αυτοκινητοδρόμους**
- Διατηρείτε **τις ποτίστρες καθαρές** κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
- **Ελέγχετε τη φυσική κατάσταση** όλων των βοοειδών (για σημάδια θερμικής καταπόνησης, στρες και τραυματισμών) σε κάθε στάση.
- Ενεργοποιήστε το **σχέδιο έκτακτης ανάγκης** άμεσα και προχωρήστε στις απαραίτητες ενέργειες, εάν δείτε σημάδια χειροτέρευσης της φυσικής κατάστασης των ζώων
- Πριν φτάσετε - **τηλεφωνήστε στο χώρο άφιξης** για να κανονίσετε γρήγορη εκφόρτωση των ζώων και επιμελή παροχή νερού και τροφής(εάν απαιτείται)



Κατάλληλη θερμοκρασία: 5°C με 30°C
προσαρμόστε με βάση την υγρασία (όταν υπάρχει το σύστημα εξαερισμού)

Livestock Weather Safety Index

Dry Bulb Temp [°C]	Relative humidity (%)					
	50	60	70	80	90	100
25,6	22,2	23,3	23,9	23,9	25	25,6
26,7	23,3	23,9	25	25,6	26,1	26,7
27,8	23,9	24,4	25,6	26,1	27,2	27,8
28,9	25	25,6	26,7	27,2	28,3	28,9
30	25,6	26,7	27,2	28,3	28,9	30
31,1	26,7	27,2	27,8	29,4	30,6	31,1
32,2	27,2	28,3	28,3	30,6	31,1	32,2
33,3	28,3	28,9	30	31,1	32,2	
34,4	28,9	30	31,1	32,2		
35,6	30	31,1	32,2			
36,7	30,6	31,7				
37,8	31,1	32,8				

Good! Alert Danger Emergency

Η υψηλή υγρασία δυσχεραίνει την αντιμετώπιση της υψηλής θερμοκρασίας. Για τον λόγο αυτό, όταν η θερμοκρασία και η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα, αποφύγετε ή περιορίστε τις μεταφορές



Σε περίπτωση ζεστού καιρού

- Προτιμάτε την οδήγηση τη νύχτα για να αποφεύγετε υψηλές θερμοκρασίες
- Σταθμεύετε τα 'παθητικώς' αεριζόμενα οχήματα κάθετα **στη διεύθυνση του ανέμου**
- **Ανοίξτε** όλες τις πλαϊνές θυρίδες ή περσίδες
- Εάν είναι δυνατόν, οδηγείτε έως το **πλησιέστερο σημείο ανάπαυσης των ζώων**
- Βεβαιωθείτε **για τη διαθέσιμη παροχή νερού σε όλα τα ζώα:** ποτίστρες και επιπλέον κουβάδες με νερό στο δάπεδο

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (δείτε το σχετικό φυλλάδιο)

- **Αρμέγετε** τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες τουλάχιστον κάθε 12 ώρες
- Ακόμα καλύτερα! Εξασφαλίστε ότι οι αγελάδες μπορούν να **φάνε και να πιούνε ενώ αρμέγονται ή αναπαύονται**, πριν επανα-φορτωθούν για τη συνέχιση του ταξιδιού



Ταξίδια μακράς διάρκειας των μόσχων (δείτε το σχετικό φυλλάδιο)



Τηλεφωνήστε στην εκτροφή ή στο σημείο ελέγχου για να κανονίσετε **άμεσα πότισμα και σίτιση με την άφιξη**, και κατάλληλες κλιματικές συνθήκες για τους μόσχους(π.χ. προ-θέρμανση του χώρου και του υποκατάστατου γάλακτος)

