

Μεταφορά αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

✓ Μεταφορά αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

Οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής είναι ευάλωτα ζώα και πρέπει να μεταφέρονται **με ιδιαίτερη φροντίδα**. Οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής που δεν αρμέγονται τακτικά **υποφέρουν από έντονους πόνους**, λόγω της αύξησης της πίεσης στους μαστούς ενώ έχουν και αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν μαστίτιδα ή άλλα νοσήματα. Ιδιαίτερη προσοχή και ορθές πρακτικές μεταφοράς μπορεί να αποτρέψουν τα παραπάνω.



Εάν μια αγελάδα δεν μπορεί να σηκωθεί σε όρθια στάση (είναι σε μόνιμη κατάκλιση), καλέστε άμεσα κτηνίατρο!

Προετοιμασία για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

1

Προσοχή - **Απαγορεύεται η μεταφορά κατά την 1^η εβδομάδα μετά τον τοκετό**

2

Εάν οι αγελάδες δεν συνοδεύονται από τα μοσχάρια τους, πρέπει να αρμέγονται **τουλάχιστον κάθε 12 ώρες**

3

Εάν οι αγελάδες θα μεταφερθούν με μακρινά ταξίδια, εξασφαλίστε ότι οι σταθμοί ελέγχου έχουν **συστήματα αρμέγματος**

5

Ακόμα καλύτερα! Παρέχετε νερό και τροφή κατά το άρμεγμα και φροντίστε οι αγελάδες να έχουν σιτισθεί/ποτισθεί πριν φορτωθούν για τη συνέχιση του ταξιδιού

4

Πάντα να **εκφορτώνετε με ηρεμία** τις αγελάδες στο διάδρομο αρμεγής του σημείου ελέγχου

Για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, οι βέλτιστες θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5 °C και 15 °C.

Κάτω από 5 °C, χρειάζεται επιπλέον θέρμανση - ειδικά με ρεύματα αέρα και υψηλή υγρασία. **Μη μεταφέρετε με θερμοκρασίες άνω των 30 °C.**