


Transportul vacilor lactante

Transportul vacilor lactante

Vacile lactante sunt animale vulnerabile și trebuie să fie transportate cu **grijă deosebită**. Vacile lactante care nu sunt mulse în mod regulat **pot suferi dureri severe**, datorită unei presiuni crescânde din uger și a riscului ridicat de a dezvolta mastită sau alte boli. O grijă deosebită și practici bune de transport pot preveni aceste probleme.



Dacă o vacă nu se mai poate ridica (*downer cow*), sună imediat veterinarul!

Pregătirea pentru vacile lactante

1

Reține – **în prima săptămână după fătare transportul este interzis**

2

Dacă vacile lactante nu sunt însoțite de vițeii lor, ele trebuie să fie mulse **cel puțin o dată la 12 ore**

3

Dacă vacile lactante trebuie să fie transportate pe distanțe lungi, asigură-te că posturile de control sunt dotate cu **echipamente de muls**

4

Întotdeauna **descarcă cu calm** vacile în platforma de muls a postului de control

5

Mai bine! **Furnizează apă și furaj** în timpul mulsului și asigură-te că vacile pot mânca / bea înainte de încărcare pentru a relua călătoria

Pentru vacile lactante, temperatura optimă este între 5°C și 15°C.

Sub 5°C, vacile au nevoie de căldură exterioară – în special dacă există curent de aer și umiditate ridicată. **Nu transporta la peste 30°C.**